Physiologie du métabolisme des lipides

Généralités :

Le métabolisme des lipides comprend :

- Métabolisme des triglycérides

- Métabolisme des acides gras

- Les réactions de synthèse sont appelées **Lipogenèse** et les réactions de dégradation sont appelées **Lipolyse**.
- Les TG représentent la principale famille de lipides naturels et l'oxydation des AG qu'ils contiennent permet la production d'une grande quantité d'ATP. De plus, ils représentent la forme de stockage des acides gras principalement dans le tissu adipeux.
- Les TG représentent plus de 90 % des graisses alimentaires ; Outre leur apport énergétique important ils sont le véhicule des vitamines liposoluble (A, D,E et K) et source d'AG polyinsaturés essentiels.
- Les triglycérides TG ou triacylglycérols TAG (TG endogènes + la plus grande partie des TG alimentaires) sont constitués par des AG à chaînes longues (C16-C20) estérifiés à une molécule de glycérol

Les lipides dans l'organisme

a) **Les lipides sanguins** : de forme de transport du :

- Tube Digestif vers le foie : **Chylomicrons**
- Foie vers le tissu adipeux : **Lipoprotéines**
- Tissu adipeux vers les organes (surtout le foie) : **AGL**
- Foie vers les organes : **Acétoacétate**

b) **Les tissus de réserve**

Les tissus mésentériques (abdomen) , sous cutanés, et péri-rénaux sont constitués essentiellement des lipides. ils renferment plus de la moitié de la graisse corporelle. Les graisses des tissus adipeux sont pour 95% des TG.

c) **Les aliments riches en lipides**

- Les AG saturés se trouvent dans les graisses animales ou dans les graisses végétales par hydrogénation (beurre, margarine, graisses d'oe, ...).
- Les graisses végétales sont plus riches en AG insaturés, on les trouve dans les huiles (H d'olive, de soja, d'arachide, ...) mais aussi les graisses de poissons gras (hareng, saumon, sardine, thon, truite) ainsi que dans les fruits secs (noix, noisettes,...)
- Les fruits et les légumes (sauf l'avocat et les fruits secs) ne contiennent pas de lipides.

Apport quotidien recommandé : 70 à 80 g.

Digestion, Absorption et Transport

Les Enzymes

- **Lipase Hépatique**
- **Lipoprotéine lipase**
- **Phospholipases**
- **Cholestérol Estérase**

Lipase hépatique

La lipoprotéine lipase ([EC 3.1.1.34](#)) est une enzyme qui hydrolyse les triglycérides contenus dans les VLDL (Very Low Density Lipoproteins) et les chylomicrons. La lipoprotéine lipase se trouve à la surface des épithéliums vasculaires, au niveau du muscle strié squelettique, des glandes mammaires et surtout au niveau du tissu adipeux.

Lipoprotéine lipase

ApoC-II, Sérumalbumine

▣ Phospholipases

la PL B combine les 2 activités A1 et A2.

Cholestérol estérase

Plan

I- Introduction

II- Transport - Digestion - Absorption

III - Métabolisme des AG

1) catabolisme

- AG saturés à n pairs
- AG saturés à n impairs
- AG insaturés
- AG ramifiés
- α et ω oxydations

2) biosynthèse

- AG saturés
- AG insaturés

- ❑ Les lipides sont plus énergétiques que les Glucides
- ❑ Aucun organe ne tire son énergie exclusivement des lipides
- ❑ Intervient pendant le jeûne, l'effort musculaire et la lutte contre le froid
- ❑ Foie, muscles squelettiques et cardiaque utilisent les AG comme «carburant» (environ 50% de leur énergie)
- ❑ Pas dans les GR (pas de mitochondries), ni dans le cerveau (utilise les corps cétoniques qui sont hydrosolubles)

Le métabolisme des acides gras se compose de processus cataboliques qui génèrent de l'énergie et de processus anaboliques qui créent des molécules biologiquement importantes. Les acides gras sont une famille de molécules classées dans la classe des macronutriments lipidiques.

En cas de besoin énergétique la cellule fait appel aux réserves lipidiques (TG) pour en tirer les AG et les cataboliser, Au contraire quand les molécules énergétiques sont en excès (Glucides, Lipides.....), la cellule les dirige vers le stockage (TG). Ce catabolisme va dépendre de la nature des AG : saturés ou insaturés, nombre de carbones pair ou impair.....

Métabolisme des AG

Catabolisme des AG à nombre de C pair

Le catabolisme des AG suit 3 étapes:

- ▣ Activation de l'AG
- ▣ Transport dans la matrice mitochondriale
- ▣ β -oxydation

Activation des AG

Pyrophosphatase

Les AcylCoA ne peuvent pas traverser la membrane mitochondriale !

Transport dans la mitochondrie

β -Oxydation

MITOCHONDRIAL
MATRIX

β-Oxydation

Dans la mitochondrie

Exemple de la β -Oxydation de l'acide palmitique C16

7 Cycles

Oxidation Complète

Acides gras : 9 kcal/g

Hydrocarbures : 4 kcal/g

Protéines : 4 kcal/g

Catabolisme des AG

AG à nombre de C impair

Dégradation des acides gras impairs

Catabolisme des AG

AG insaturés, ex Acide Linoléique $\Delta^{9,12}$ C18:2 (oméga-6)

E. Jaspard (2013)

E. Jaspard (2013)

Dégradation des ac. gras insaturés

Linoléoyl-CoA (18 : 2; 9,12)

Catabolisme des AG

α et ω oxydations

L'alpha-oxydation (α -oxydation) est une voie métabolique de dégradation des acides gras par raccourcissement de la chaîne carbonée d'un atome de carbone du côté carboxyle $-\text{COOH}$, contrairement à la β -oxydation qui consiste à raccourcir de deux atomes de carbone côté carboxyle. Chez l'homme, l' α -oxydation intervient dans les peroxysomes pour convertir l'acide phytanique en acide pristanique, qui est ensuite dégradé par β -oxydation comme tous les autres acides gras.

L' ω -oxydation est une voie métabolique de dégradation des acides gras alternative à la β -oxydation. Contrairement à cette dernière, l' ω -oxydation ne nécessite pas de coenzyme A et ne se déroule pas dans les mitochondries mais dans le réticulum endoplasmique ; chez les vertébrés, elle a lieu principalement dans le foie et les reins.

Elle consiste en la carboxylation de l'extrémité aliphatique d'un acide gras, sur l'atome de carbone le plus éloigné de l'extrémité carboxyle, appelé carbone ω , d'où le nom de cet ensemble de réactions ; l'acide dicarboxylique résultant est ensuite métabolisé dans le cytoplasme ou peut être activé sur la coenzyme A pour rejoindre la β -oxydation dans les mitochondries.

Biosynthèse des AG

AG Saturés

AG Insaturés

Biosynthèse des AG

Lieu et origine des AG substrats

Principales étapes

- La majorité des AG sont exogènes
- La biosynthèse est faible (en cas de surcharge en Glucide)
- La biosynthèse à partir de l'AcCoA selon 3 mécanismes différents :
 - ✓ Cytoplasmique (Voie de Wakil jusqu'au palmitoyl-CoA)
 - ✓ Elongation mitochondriale
 - ✓ Elongation et désaturation microsomale (formation des AG insaturés)

SIEGE ET SUBSTRATS

- Lieu = Foie, Tissus adipeux, Glandes mammaires

- Siège cellulaire = cytoplasme ⇒ sortie des acétylcoA de la mitochondrie S/F de Citrate

Les acteurs :

- acétylCoA (glycolyse, β -oxydation,
- malonylCoA
- ACP (Acyl Carrier Protein)
- Cystéine
- Acylsynthétase
- AG synthétase

Rq : Pour les AG insaturés, on a les mêmes acteurs + une désaturase, de l'O₂ et du NADH H⁺

A. Acides gras synthase

- ① Entrée du substrat
- ② Allongement de la chaîne
- ③ Réduction
- ④ Élimination d'eau
- ⑤ Réduction
- ⑥ Libération des produits
- ⑦